Continue

توقيع المبادئ التوجيهية متلازمة الشريان التاجي الحادة pdf

[illegible] ST-1200 الخلفية: المبادئ التوجيهية الحالية توصي استراتيجية في وقت مبكر الغازية للمرضى الذين يعانون من أعراض الشريان التاجي الحادة بدون Test your KnowledgeTake a Quiz! Authors Category Primary study JournalThe New England journal of medicine Year 2005 Links Pubmed, DOI .تنجم المتلازماتُ التاجية الحادة عن حدوث انسداد مفاجئ في الشريان التاجي.ويتسبَّب هذا الانسداد في حدوث ذبحة صدريَّة غير مستقرة أو نوبة قلبية (احتشاء عضلة القلب)، وذلك وفقًا لموضع الانسداد وحجمه.النوبة القلبية هي موت أنسجة القلب بسبب غياب التروية الدموية
This translation has been produced by an automated software. If you wish to submit your own translation, please send it to translations@epistemonikos.org Epistemonikos ID: dff0e70cbb8c8033e33e2f9321dab92e66322d13 First added on: Jun 08, قطعة وارتفاع مع ارتفاع مستوى القلب تروبونين تي-ST الاستنتاجات: نحن لم يستطع إثبات أنه نظرا العلاج الطبي الأمثل، ووضع استراتيجية في وقت مبكر الغازية كانت متفوقة على استراتيجية الغازية بشكل انتقائي في المرضى الذين يعانون من متلازمة [illegible] (15.0 في المئة مقابل 10.0 [illegible]
ب. كم من الوقت يستمر الانسداد. مقدار الضرر الذي يسببه. أنواع المتلازمة التاجية الحادة: الذبحة الصدرية غير المستقرة .(Myocardial infarction) هو مصطلح واسع النطاق لثلاثة أنواع من مرض الشريان التاجي التي تؤثر على ملايين الأشخاص كل عام. تحدث هذه الحالات التي تهدد الحياة عندما يتسبب الانسداد في إبطاء تدفق الدم إلى القلب فجأة أو توقفه. يمكن للأشخاص المصابين بمتلازمة الشريان التاجي الحادة أن يعانوا من الذبحة الصدرية غير المستقرة أو احتشاء عضلة القلب (Acute Coronary Syndrome) متلازمة الشريان التاجي الحادة (Acute Coronary Syndrome) والمواد المغذية الموجودة في الدم حتى تتمكن من ضخ الدم عبر القلب وبقية الجسم. متلازمة الشريان التاجي الحادة
تاع الحمضي المزمن .(Pulmonary embolism) جلطة دموية في الرئة أو الانسداد الرئوي .(Asthma) الربو .(Aortic stenosis) ارتفاع ضغط الدم أو تسمم الحمل أو سكري الحمل. حالات أخرى مثل متلازمة الشريان التاجي الحادة يمكن أن تسبب حالات أخرى ألمًا في الصدر غير القلبي وأعراضًا تشبه متلازمة الشريان التاجي الحادة. لذا يجب علي المريض الحصول على رعاية طبية سريعة حتى يتمكن من الحصول على تشخيص دقيق والعلاج المناسب. تشمل الحالات المشابهة لمتلازمة الشريان التاجي الحادة: تضيق الصمام الأورطي .(Hypertension) مرض السكري. تاريخ عائلي [illegible] 19-
ر كالذبحة الصدرية. يمكن أن يشعر المريض حينها بما يلي: ألم (Symptoms of acute coronary syndrome) أعراض متلازمة الشريان التاجي الحادة .(Spontaneous coronary artery dissection – SCAD) تشريح الشريان التاجي التلقائي .(Coronary artery spasm) و يحدث هذا الانسداد بسبب جلطة دموية أو فقاعة هواء أو دهون أو مواد أخرى. تشنج الشريان التاجي (Coronary artery embolism) إلى إتلاف عضلة القلب، مما يؤدي إلى الذبحة الصدرية غير المستقرة أو النوبة القلبية. في حالات نادرة، يحدث متلازمة الشريان التاجي الحادة بسبب: انسداد الشريان التاجي (Ischemia) وبالتالي لا يستطيع القلب الحصول على ما يكفي من الأكسجين. يؤدي نقص الأكسجين ،(Myocardium)
القلب بالرنين المغناطيسي (CT scan) يقوم مقدمو الرعاية الصحية بتشخيص متلازمة الشريان التاجي الحادة باستخدام الفحص البدني واختبارات الدم وتخطيط كهربية القلب، الذي يسجل النشاط الكهربائي للقلب. تساعد النتائج مقدم الرعاية الصحية الخاص بالمريض في تحديد ما إذا كانت حالته عبارة عن نوبة قلبية أو ذبحة صدرية غير مستقرة. يمكن أن تساعد الاختبارات الإضافية في استبعاد الحالات الأخرى وتوجيه العلاج. بعض الاختبارات، مثل اختبار الإجهاد بالتمارين الرياضية أو اختبار الإجهاد الدوائي، تزيد من معدل ضربات القلب لإظهار مدى عمل القلب بأقصى قوة. يستخدم مقدمو الرعاية الصحية أيضًا دراسات التصوير، مثل التصوير المقطعي المحوسب (Diagnosis of Acute coronary syndrome)
طات (Statins) الستاتينات .(Pain relievers) لتحسين تدفق الدم وتخفيف آلام الصدر. مسكنات الألم (Nitroglycerin) لتنظيم ضغط الدم وإبطاء معدل ضربات القلب. النيتروجلسرين (Beta-blockers) لخفض ضغط الدم. حاصرات بيتا (Angiotensin-converting enzyme inhibitors – ACEI) على الحالة المحددة التي يعاني منها. يتضمن العلاج عادةً مزيجًا من الأدوية والإجراءات لفتح الشرايين واستعادة وظيفة القلب. وتعتمد هذه الأدوية التي يتلقاها المريض على حالته المحددة. في بعض الحالات، قد يصف له مقدم الرعاية الأدوية قبل تأكيد التشخيص. وقد تشمل الأدوية: مضادات التخثر أو مميعات الدم، مثل الأسبرين أو الهيبارين، لإذابة الجلطات أو منع تكونها. مثبطات الإنزيم المحول للأنجيوتنسين
م، بالإضافة إلى متخصصين معترف بهم من الشركات الرائدة والجامعات المرموقة.سيتيح محتوى البرنامج المتعدد الوسائط، والذي صيغ بأحدث التقنيات التعليمية، للمهني التعلم السياقي والموقعي، أي في بيئة محاكاة توفر تدريبا غامرا مبرمجا للتدريب في حالات حقيقية.يركز تصميم هذا البرنامج على التعلّم القائم على المشكلات، والذي يجب على المهني من خلاله محاولة حل مختلف مواقف الممارسة المهنية التي تنشأ على مدار السنة الدراسية. للقيام بذلك، سيحصل على مساعدة من نظام فيديو تفاعلي مبتكر من قبل خبراء مشهورين. تم تطوير محتوى هذا المؤهل العلمي بشكل أساسي بناءً على معايير فريق التدريس الذي تولى مسؤولية تصميم هيكلها بناءً على المعايير التربوية ومعايير الجودة التي وضعتها
9. [illegible] دلائل إعادة دمج الشريان التاجي: مشكلة التوقيت وحدة 6. متلازمة الشريان التاجي الحادة بدون ارتفاع في المقطع [illegible] TD في قسم الطوارئ. تقييم وخوارزمية لتشخيص المرضى الذين يعانون من
ط صدى القلب. الارتباط بنتائج تصوير الأوعية الدموية وحدة 8. متلازمة الشريان التاجي [illegible] (MINOCA) وحدة 7. متلازمة الشريان [illegible] القلب
ئ، وأن التشخيص المبكر لمتلازمة الشريان التاجي الحادة أساسي لتجنب المضاعفات. لذلك، يوفر هذا الماجستير في متلازمة الشريان التاجي الحادة للأخصائيين أحدث التقدمات في إدارة المتلازمة، وطرق التشخيص، والعلاجات، والوقاية، فضلاً عن مراجعة مفصلة لبرامج إعادة التأهيل القلبي. في الواقع، شارك أبرز الخبراء في أمراض القلب في إنشاء هذا البرنامج، بهدف تمكين الخريجين من توسيع معارفهم في هذا المجال وتحسين أدائهم المهني. يتضمن البرنامج مواد نظرية وتكميلية محدثة وعالية الجودة، مما يجعل هذا الماجستير خيارًا ممتازًا لأولئك المحترفين الذين يرغبون في صقل مهاراتهم ومعارفهم في مجال أمراض القلب. سيطر على أكثر السيناريوهات تحديًا في متلازمة الشريان التاجي الحادة أنشأت
أعدها المعلمون، وملخصات ديناميكية لكل وحدة، وحالات سريرية حقيقية، ومقالات بحثية للتعمق في كل موضوع. وبالمثل، تُقدم دورات تعليمية فردية لحل أي استفسار قد يظهر خلال التجربة الأكاديمية.