Continue

Denominación genérica: FlurbiprofenoForma farmacéutica y formulación: Pastillas para chupar de Flurbiprofeno Indicaciones terapéuticas: Alivio sintomático del dolor de garganta agudo en ads. (spray y pastillas) y niños > de 12 años (sólo pastillas).Farmacocinética y farmacodinamia: Mecanismo de acción: El flurbirpofeno es un AINE derivado del ácido propiónico que ha demostrado su eficacia en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. En humanos, el flurbiprofeno tiene potentes efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, y reduce la síntesis de prostaglandinas en células respiratorias humanas en cultivo. Según los entudios en sangre total, el flurbiprofeno es un inhibidor mixto de la COX-1/COX-2 con cierta selectividad hacia la COX-1.Contraindicaciones: Hipersensibilidad; pacientes que han presentado con anterioridad reacciones de hipersensibilidad (asma, broncoespasmo, rinitis, angioedema o urticaria) asociadas a AAS u otros AINE; úlcera/hemorragia péptica activa o recurrente (2 o más episodios distintos de ulceración probada) y ulceración intestinal; antecedentes de hemorragia o perforación gastrointestinal, colitis grave, trastornos hemorrágicos o hematopoyéticos relacionados con el tto. previo con AINE; último trimestre del embarazo; insuf. cardíaca grave, I.R. o I.H. grave; niños y adolescentes < 18 años (sólo spray).Precauciones generales: Usar dosis mín. efectiva durante el mín. tiempo necesario; precaución en: pacientes con historial previo de asma bronquial o enf. alérgica (riesgo de broncoespasmo), con antecedentes de enf. gastrointestinal (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn), con lupus eritematoso sistémico y enf. mixta del tejido conectivo (riesgo elevado de meningitis aséptica), con alteraciones cardíacas, hepáticas o renales, en terapia diurética o ancianos (monitorizar función renal), con antecedentes de hipertensión y/o insuf. cardiaca, con potencial de sangrado anómalo; concomitancia con: otros AINE (incluidos los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2, corticosteroides orales, anticoagulantes como la warfarina, ISRS o antiagregantes plaquetarios como AAS; suspender el tto. si aparece sangrado gastrointestinal, ulceración, eritema cutáneo, lesiones de la mucosa o cualquier signo de hipersensibilidad (riesgo de reacciones cutáneas severas, algunas de ellas mortales, como dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica); valorar de nuevo el tto. en casos de faringitis/amigdalitis bacteriana purulenta.Restricciones de uso durante el embarazo y la lactancia: Embarazo: La inhibición de la síntesis de las prostaglandinas afecta de forma adversa al embarazo y al desarrollo embriofetal. Existen datos de estudios epidemiológicos que sugieren un aumento de riesgo de aborto y de malformación cardíaca y gastrosquisis tras la toma de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas al principio del embarazo. El riesgo absoluto de malformación cardiovascular aumentó de menos del 1% hasta el 1,5% aproximadamente. Parece que el riesgo aumenta en función de la dosis y la duración del tratamiento. La administración de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas en animales ha producido como resultado un aumento de pérdida de fetos pre- y postimplantación y de letalidad embriofetal. Además, se ha notificado un aumento de incidencias de diferentes malformaciones, incluyendo cardiovasculares, en animales a los que se suministró un inhibidor de la síntesis de prostaglandina durante el período organogénico. Durante el primer y segundo trimestres del embarazo debe evitarse la administración de flurbiprofeno, a no ser que sea estrictamente necesario. Si se administra flurbiprofeno a una mujer que planea concebir, o durante el primer y segundo trimestre de embarazo, deberá administrarse la dosis menor que sea eficaz durante el menor tiempo posible. Durante el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas pueden exponer al feto a: toxicidad cardiopulmonar (con cierre prematuro del conducto arterioso e hipertensión pulmonar), disfunción renal, que puede progresar a fallo renal con oligohidramnios. Además, pueden exponer a la madre y al neonato, al final del embarazo, a: posible prolongación del tiempo de hemorragia, un efecto antiagregante que puede producirse incluso a dosis muy bajas, inhibición de contracciones uterinas, que daría lugar a un retraso o prolongación del parto. Por lo tanto, el flurbiprofeno está contraindicado durante el tercer trimestre del embarazo. Lactancia: En estudios limitados, el flurbiprofeno aparece en leche materna en concentraciones muy bajas y es muy poco probable que afecte al lactante de forma adversa. De todos modos, debido a los efectos adversos que los AINE pueden causar en el lactante, no está recomendado en mujeres en periodo de lactancia.Reacciones secundarias y adversas: Mareo, cefalea, parestesia; irritación de garganta; diarrea, ulceración de la boca, náuseas, dolor bucal, parestesia oral, dolor orofaríngeo, molestias en la boca (sensación de calor o quemazón u hormigueo en la boca).Interacciones medicamentosas y de otro género: Véase Advertencias y precauciones Además: Usar con precaución en combinación con: antihipertensivos (diuréticos, IECA, antagosnistas de la angiotensina II), alcohol, glucósidos cardíacos, ciclosporina, corticosteroides, litio, metotrexato, mifepristona, antidiabéticos orales, fenitoína, ahorradores de potasio, probenecid, sulfinpirazona, quinolonas, tacrolimús, zidovudina.Presentaciones: Caja de cartón con 4, 8 ó 16 pastillas de 8.75 mg sabor miel-limón en envase de burbuja. aja de cartón con 4, 8 ó 16 pastillas de 8.75 mg sabor naranja sin azúcar en envase de burbuja.Nombre y domicilio del laboratorio: Fabricante del Medicamento: Reckitt Benckiser Healthcare International Limited Thane Road, Nottingham, Nottinghamshire, NG90 2DB, Reino Unido. Para: Reckitt & Colman Limited, Dansom Lane, Hull, HU8 7DS., Inglaterra.Número de registro del medicamento: 029M2017 SSA VI Nombres Comerciales: Graneodin B / Graneodin F Nombre Genérico: Benzocaína / Flurbiprofeno Sirve para Síntomas: Aliviar afecciones en la garganta Graneodin es un analgésico antiinflamatorio compuesto por benzocaína y flurbiprofeno que sirven para tratar algunas afecciones leves que ocurren en la garganta tales como: Dolor de garganta. Irritaciones leves. Afonía: Representa la pérdida total o parcial de la voz y generalmente suele producirse como consecuencia de una inflamación en la laringe, un resfriado común o hasta incluso por el mal uso de la voz. En los casos más graves se podrían desarrollar lesiones en las cuerdas vocales junto a nódulos, pólipos, etc. Tos. Ronquera. Dolor en deglución: Es un dolor que se manifiesta en la parte superior del cuello o en la parte baja por detrás del esternón al momento de tragar. Así mismo, ocasiona una serie de síntomas que van desde una presión en el cuello al comer hasta dolor en el tórax y sensación de obstrucción en la garganta. Cosquilleo. La benzocaína es un anestésico local con acción inmediata que se encarga de bloquear tanto el inicio como la propagación del impulso nervioso. Esto ocurre gracias a que interfiere en el cambio de los iones de potasio y sodio mediante la membrana celular. Por otro lado, el flurbiprofeno cuenta con una acción potente compuesta por propiedades antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. Dichos elementos se unen en esta sustancia y atacan directamente la síntesis de prostaglandina que son las moléculas encargadas de producir el cuadro de inflamación, fiebre y dolor. Se encuentra también como: Graneodin B: Compuesta por Benzocaína únicamente, es específico para aliviar el dolor. Graneodin F: Compuesta por Flurbiprofeno. Se emplea más que todo para reducir la inflamación. Presentaciones y formas de Administración Graneodin es fabricado por los laboratorios Reckitt bajo las siguientes presentaciones: Pastillas de 10 mg de benzocaína. Estas se pueden encontrar en cajas con 24 y 60 unidades con sabor a frambuesa, miel-limón, coco y mandarina. Bajo el nombre de Graneodin B. Pastillas de 8.75 mg de flurbiprofeno. Estas se comercializan en cajas con 16 unidades con sabor a miel-limón y naranja. Bajo el nombre de Graneodin F. Dosis Recomendadas por Edad Presentación 6 a 12 años Adultos Veces al día Pastillas de 10 mg de benzocaína 1 1 8 Pastillas de 8.75 mg de flurbiprofeno No 1 5 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* Medicamento en niños: La administración de graneodin B está contraindicada para niños menores de 6 años y la de graneodin F no está permitida en niños menores de 12 años de edad. Las pastillas deben ser disueltas lentamente en la boca entre las comidas. En el caso de la presentación de benzocaína, se deben administrar las pastillas cada 2 horas sin exceder la dosis diaria recomendada, mientras que las de flurbiprofeno pueden consumirse cada 3 o 6 horas sin sobrepasar la dosis diaria indicada. No se recomienda prolongar el tratamiento por más de 3 días. Generales: No se recomienda su uso en personas que hayan sufrido de pérdidas de sangre a nivel gastrointestinal, así como también aquellas que padezcan de inflamación grave en el colon, problemas de coagulación en la sangre y pérdida continua de la misma. Alergias: Evitar su consumo en caso de presentar hipersensibilidad al flurbiprofeno, a la benzocaína o al resto de componentes que se encuentran en la fórmula de este medicamento. Mezcla con Alcohol: A pesar de que la ingesta de alcohol no está contraindicada durante el tratamiento, es de suma importancia moderar su consumo porque esta sustancia podría potenciar la aparición de los efectos secundarios si se ingiere con frecuencia. Mezclar con otros medicamentos: El Graneodin puede inhibir la acción de las sulfamidas y otros medicamentos antihipertensivos como el enalapril, glucósidos cardíacos como la digoxina o ahorradores de potasio como el espironolactona, amilorida o triamtereno. Compatibilidad de Graneodin en Embarazo y Lactancia EMBARAZO ALTO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Graneodin no puede ser administrado durante el embrazo ya que de momento no existen estudios controlados en mujeres embarazadas para conocer con exactitud si este medicamento podría o no causar daños en el feto, por lo que sólo deberá ser utilizado si el médico encargado así lo indica luego de evaluar los riesgos y beneficios. Graneodin es apto para su uso en la lactancia según la reseña de e-lactancia, aún no se han registrado datos sobre su excreción en la leche materna. Por ello, puede ser utilizado durante esta etapa porque no causaría ningún efecto en el lactante. Efectos Secundarios En algunos casos se podrían presentar estos efectos secundarios: Frecuente (1 de cada 100 personas): Poco frecuente (1 de cada 1.000 personas): Trastornos psiquiátricos: insomnio. Sistema nervioso: somnolencia. Sistema respiratorio: asma, dificultad para respirar. Es muy importante consultar a un médico en caso de que se presente cualquiera de estos síntomas durante el periodo de consumo del medicamento. Fuentes Médicas La compañía internacional de salud e higiene del consumidor, Reckitt Benckiser (RB), presentó Graneodín F, un novedoso medicamento que contiene 8.75 mg de flurbiprofeno. Brinda doble acción, analgésica y antiinflamatoria que actúa directamente en la zona afectada; comienza actuar en 2 minutos, provee efecto analgésico a partir de los 12 minutos y brinda alivio de 4 a 6 horas. Graneodín F actúa inhibiendo las prostaglandinas gracias a la alta efectividad de los 8.75 mg de flurbiprofeno (200 veces más potente que el ácido acetilsalicílico). De acuerdo a la 9ª Liberación de Medicamentos Innovadores de la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS), es la primera vez que se utiliza este potente antiinflamatorio no esteroideo (AINE) para tratar el dolor de garganta. Expertos en el tema presentaron a Graneodín F, como una opción eficiente para tratar el dolor de garganta, buscando reducir el uso innecesario de antibióticos. En México y en el resto del mundo, la resistencia bacteriana es un problema de salud pública y se reconoce como una importante amenaza para la salud, Tanto la Organización Mundial de la Salud (OMS) como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) están tomando acciones para hacerle frente. El Dr. Martín Duerden, médico del Reino Unido y miembro de la Alianza Global contra las Infecciones Respiratorias (GRIP), "la resistencia antimicrobiana se da principalmente por el mal uso de los antibióticos". A decir del especialista, "en el Reino Unido cerca del 90% de estas infecciones no requieren del uso de antibióticos, ya que no son de origen bacteriano". Así mismo la Dra. Ana María Ocaña, maestra en investigación de servicios de salud comentó que: "Graneodín F es el único AINE de acción local que contiene flurbiprofeno y esta específicamente indicado para el dolor de garganta y que puede ser una opción para iniciar el tratamiento y evitar el uso innecesario de antibióticos". Graneodín F busca brindar una nueva alternativa para tratar el dolor de garganta. Está indicado en niños, a partir de 12 años de edad, y en adultos. Hay 2 presentaciones: sabor naranja y sabor miel limón. El sabor naranja no contiene azúcar, por lo que lo pueden tomar pacientes con restricción de ésta. Graneodín F no necesita prescripción médica, la dosis recomendada es 1 pastilla cada 4 o 6 horas durante tres días, máximo 5 pastillas en 24 horas. Con Graneodín F se da un giro al tratamiento del dolor de garganta, buscando aliviar uno de los padecimientos más frecuentes. Nombres Comerciales: Graneodin B / Graneodin F Nombre Genérico: Benzocaína / Flurbiprofeno Sirve para Síntomas: Aliviar afecciones en la garganta Graneodin es un analgésico antiinflamatorio compuesto por benzocaína y flurbiprofeno que sirven para tratar algunas afecciones leves que ocurren en la garganta tales como: Dolor de garganta. Irritaciones leves. Afonía: Representa la pérdida total o parcial de la voz y generalmente suele producirse como consecuencia de una inflamación en la laringe, un resfriado común o hasta incluso por el mal uso de la voz. En los casos más graves se podrían desarrollar lesiones en las cuerdas vocales junto a nódulos, pólipos, etc. Tos. Ronquera. Dolor en deglución: Es un dolor que se manifiesta en la parte superior del cuello o en la parte baja por detrás del esternón al momento de tragar. Así mismo, ocasiona una serie de síntomas que van desde una presión en el cuello al comer hasta dolor en el tórax y sensación de obstrucción en la garganta. Cosquilleo. La benzocaína es un anestésico local con acción inmediata que se encarga de bloquear tanto el inicio como la propagación del impulso nervioso. Esto ocurre gracias a que interfiere en el cambio de los iones de potasio y sodio mediante la membrana celular. Por otro lado, el flurbiprofeno cuenta con una acción potente compuesta por propiedades antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. Dichos elementos se unen en esta sustancia y atacan directamente la síntesis de prostaglandina que son las moléculas encargadas de producir el cuadro de inflamación, fiebre y dolor. Se encuentra también como: Graneodin B: Compuesta por Benzocaína únicamente, es específico para aliviar el dolor. Graneodin F: Compuesta por Flurbiprofeno. Se emplea más que todo para reducir la inflamación. Presentaciones y formas de Administración Graneodin es fabricado por los laboratorios Reckitt bajo las siguientes presentaciones: Pastillas de 10 mg de benzocaína. Estas se pueden encontrar en cajas con 24 y 60 unidades con sabor a frambuesa, miel-limón, coco y mandarina. Bajo el nombre de Graneodin B. Pastillas de 8.75 mg de flurbiprofeno. Estas se comercializan en cajas con 16 unidades con sabor a miel-limón y naranja. Bajo el nombre de Graneodin F. Dosis Recomendadas por Edad Presentación 6 a 12 años Adultos Veces al día Pastillas de 10 mg de benzocaína 1 1 8 Pastillas de 8.75 mg de flurbiprofeno No 1 5 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* Medicamento en niños: La administración de graneodin B está contraindicada para niños menores de 6 años y la de graneodin F no está permitida en niños menores de 12 años de edad. Las pastillas deben ser disueltas lentamente en la boca entre las comidas. En el caso de la presentación de benzocaína, se deben administrar las pastillas cada 2 horas sin exceder la dosis diaria recomendada, mientras que las de flurbiprofeno pueden consumirse cada 3 o 6 horas sin sobrepasar la dosis diaria indicada. No se recomienda prolongar el tratamiento por más de 3 días. Generales: No se recomienda su uso en personas que hayan sufrido de pérdidas de sangre a nivel gastrointestinal, así como también aquellas que padezcan de inflamación grave en el colon, problemas de coagulación en la sangre y pérdida continua de la misma. Alergias: Evitar su consumo en caso de presentar hipersensibilidad al flurbiprofeno, a la benzocaína o al resto de componentes que se encuentran en la fórmula de este medicamento. Mezcla con Alcohol: A pesar de que la ingesta de alcohol no está contraindicada durante el tratamiento, es de suma importancia moderar su consumo porque esta sustancia podría potenciar la aparición de los efectos secundarios si se ingiere con frecuencia. Mezclar con otros medicamentos: El Graneodin puede inhibir la acción de las sulfamidas y otros medicamentos antihipertensivos como el enalapril, glucósidos cardíacos como la digoxina o ahorradores de potasio como el espironolactona, amilorida o triamtereno. Compatibilidad de Graneodin en Embarazo y Lactancia EMBARAZO ALTO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Graneodin no puede ser administrado durante el embrazo ya que de momento no existen estudios controlados en mujeres embarazadas para conocer con exactitud si este medicamento podría o no causar daños en el feto, por lo que sólo deberá ser utilizado si el médico encargado así lo indica luego de evaluar los riesgos y beneficios. Graneodin es apto para su uso en la lactancia según la reseña de e-lactancia, aún no se han registrado datos sobre su excreción en la leche materna. Por ello, puede ser utilizado durante esta etapa porque no causaría ningún efecto en el lactante. Efectos Secundarios En algunos casos se podrían presentar estos efectos secundarios: Frecuente (1 de cada 100 personas): Poco frecuente (1 de cada 1.000 personas): Trastornos psiquiátricos: insomnio. Sistema nervioso: somnolencia. Sistema respiratorio: asma, dificultad para respirar. Es muy importante consultar a un médico en caso de que se presente cualquiera de estos síntomas durante el periodo de consumo del medicamento. Fuentes Médicas Nombres Comerciales: Graneodin B / Graneodin F Nombre Genérico: Benzocaína / Flurbiprofeno Sirve para Síntomas: Aliviar afecciones en la garganta Graneodin es un analgésico antiinflamatorio compuesto por benzocaína y flurbiprofeno que sirven para tratar algunas afecciones leves que ocurren en la garganta tales como: Dolor de garganta. Irritaciones leves. Afonía: Representa la pérdida total o parcial de la voz y generalmente suele producirse como consecuencia de una inflamación en la laringe, un resfriado común o hasta incluso por el mal uso de la voz. En los casos más graves se podrían desarrollar lesiones en las cuerdas vocales junto a nódulos, pólipos, etc. Tos. Ronquera. Dolor en deglución: Es un dolor que se manifiesta en la parte superior del cuello o en la parte baja por detrás del esternón al momento de tragar. Así mismo, ocasiona una serie de síntomas que van desde una presión en el cuello al comer hasta dolor en el tórax y sensación de obstrucción en la garganta. Cosquilleo. La benzocaína es un anestésico local con acción inmediata que se encarga de bloquear tanto el inicio como la propagación del impulso nervioso. Esto ocurre gracias a que interfiere en el cambio de los iones de potasio y sodio mediante la membrana celular. Por otro lado, el flurbiprofeno cuenta con una acción potente compuesta por propiedades antipiréticas, analgésicas y antiinflamatorias. Dichos elementos se unen en esta sustancia y atacan directamente la síntesis de prostaglandina que son las moléculas encargadas de producir el cuadro de inflamación, fiebre y dolor. Se encuentra también como: Graneodin B: Compuesta por Benzocaína únicamente, es específico para aliviar el dolor. Graneodin F: Compuesta por Flurbiprofeno. Se emplea más que todo para reducir la inflamación. Presentaciones y formas de Administración Graneodin es fabricado por los laboratorios Reckitt bajo las siguientes presentaciones: Pastillas de 10 mg de benzocaína 1 1 8 Pastillas de 8.75 mg de flurbiprofeno No 1 5 *Uso y dosis debe ser siempre recetada por un médico* Medicamento en niños: La administración de graneodin B está contraindicada para niños menores de 6 años y la de graneodin F no está permitida en niños menores de 12 años de edad. Las pastillas deben ser disueltas lentamente en la boca entre las comidas. En el caso de la presentación de benzocaína, se deben administrar las pastillas cada 2 horas sin exceder la dosis diaria recomendada, mientras que las de flurbiprofeno pueden consumirse cada 3 o 6 horas sin sobrepasar la dosis diaria indicada. No se recomienda prolongar el tratamiento por más de 3 días. Generales: No se recomienda su uso en personas que hayan sufrido de pérdidas de sangre a nivel gastrointestinal, así como también aquellas que padezcan de inflamación grave en el colon, problemas de coagulación en la sangre y pérdida continua de la misma. Alergias: Evitar su consumo en caso de presentar hipersensibilidad al flurbiprofeno, a la benzocaína o al resto de componentes que se encuentran en la fórmula de este medicamento. Mezcla con Alcohol: A pesar de que la ingesta de alcohol no está contraindicada durante el tratamiento, es de suma importancia moderar su consumo porque esta sustancia podría potenciar la aparición de los efectos secundarios si se ingiere con frecuencia. Mezclar con otros medicamentos: El Graneodin puede inhibir la acción de las sulfamidas y otros medicamentos antihipertensivos como el enalapril, glucósidos cardíacos como la digoxina o ahorradores de potasio como el espironolactona, amilorida o triamtereno. Compatibilidad de Graneodin en Embarazo y Lactancia EMBARAZO ALTO LACTANCIA BAJO RIESGO BAJO Graneodin no puede ser administrado durante el embrazo ya que de momento no existen estudios controlados en mujeres embarazadas para conocer con exactitud si este medicamento podría o no causar daños en el feto, por lo que sólo deberá ser utilizado si el médico encargado así lo indica luego de evaluar los riesgos y beneficios. Graneodin es apto para su uso en la lactancia según la reseña de e-lactancia, aún no se han registrado datos sobre su excreción en la leche materna. Por ello, puede ser utilizado durante esta etapa porque no causaría ningún efecto en el lactante. Efectos Secundarios En algunos casos se podrían presentar estos efectos secundarios: Frecuente (1 de cada 100 personas): Poco frecuente (1 de cada 1.000 personas): Trastornos psiquiátricos: insomnio. Sistema nervioso: somnolencia. Sistema respiratorio: asma, dificultad para respirar. Es muy importante consultar a un médico en caso de que se presente cualquiera de estos síntomas durante el periodo de consumo del medicamento. Fuentes Médicas Nombre local: GRANEODIN F PASTILLA SABOR MIEL-LIMÓN 8,75 mg País: México Laboratorio: RECKITT BENCKISER HEALTHCARE (UK) LIMITED Registro sanitario: 029M2017 SSA Vía: bucal Forma: pastilla ATC: Flurbiprofeno, otros preparados para la garganta (R02AX01) Embarazo: Contraindicado lactancia: evitar Sistema respiratorio > Preparados para la garganta > Preparados para la garganta > Otros preparados para la garganta El flurbirpofeno es un AINE derivado del ácido propiónico que ha demostrado su eficacia en la inhibición de la síntesis de prostaglandinas. En humanos, el flurbiprofeno tiene potentes efectos analgésicos, antipiréticos y antiinflamatorios, y reduce la síntesis de prostaglandinas en células respiratorias humanas en cultivo. Según los entudios en sangre total, el flurbiprofeno es un inhibidor mixto de la COX-1/COX-2 con cierta selectividad hacia la COX-1. Indicaciones terapéuticasFlurbiprofeno, otros preparados para la garganta Alivio sintomático del dolor de garganta agudo en ads. (spray y pastillas) y niños > de 12 años (sólo pastillas). PosologíaFlurbiprofeno, otros preparados para la garganta Vía bucal, sólo a corto plazo. Pastillas: ads. y niños > 12 años: disolver/chupar 1 pastilla cada 3-6 h. Máx. 5 pastillas/día. Duración máx. del tto.: 3 días. Spray: ads. > 18 años: 1 aplic. de 3 pulverizaciones cada 3-6 h. Máx. 5 aplic./día. No inhalar mientras se realiza la pulverización. Duración máx. del tto.: 3 días. ContraindicacionesFlurbiprofeno, otros preparados para la garganta Hipersensibilidad; pacientes que han presentado con anterioridad reacciones de hipersensibilidad (asma, broncoespasmo, rinitis, angioedema o urticaria) asociadas a AAS u otros AINE; úlcera/hemorragia péptica activa o recurrente (2 o más episodios distintos de ulceración probada) y ulceración intestinal; antecedentes de hemorragia o perforación gastrointestinal, colitis grave, trastornos hemorrágicos o hematopoyéticos relacionados con el tto. previo con AINE; último trimestre del embarazo; insuf. cardíaca grave, I.R. o I.H. grave; niños y adolescentes < 18 años (sólo spray). Advertencias y precauciones Flurbiprofeno, otros preparados para la garganta Usar dosis mín. efectiva durante el mín. tiempo necesario; precaución en: pacientes con historial previo de asma bronquial o enf. alérgica (riesgo de broncoespasmo), con antecedentes de enf. gastrointestinal (colitis ulcerosa, enfermedad de Crohn), con lupus eritematoso sistémico y enf. mixta del tejido conectivo (riesgo elevado de meningitis aséptica), con alteraciones cardíacas, hepáticas o renales, en terapia diurética o ancianos (monitorizar función renal), con antecedentes de hipertensión y/o insuf. cardiaca, con potencial de sangrado anómalo; concomitancia con: otros AINE (incluidos los inhibidores selectivos de ciclooxigenasa 2, corticosteroides orales, anticoagulantes como la warfarina, ISRS o antiagregantes plaquetarios como AAS; suspender el tto. si aparece sangrado gastrointestinal, ulceración, eritema cutáneo, lesiones de la mucosa o cualquier signo de hipersensibilidad (riesgo de reacciones cutáneas severas, algunas de ellas mortales, como dermatitis exfoliativa, síndrome de Stevens-Johnson y necrólisis epidérmica tóxica); valorar de nuevo el tto. en casos de faringitis/amigdalitis bacteriana purulenta. Insuficiencia renalFlurbiprofeno, otros preparados para la garganta Contraindicado en I.R. severa. Precaución en pacientes con alteraciones renales. InteraccionesFlurbiprofeno, otros preparados para la garganta Véase Prec. Además: Usar con precaución en combinación con: antihipertensivos (diuréticos, IECA, antagosnistas de la angiotensina II), alcohol, glucósidos cardíacos, ciclosporina, corticosteroides, litio, metotrexato, mifepristona, antidiabéticos orales, fenitoína, ahorradores de potasio, probenecid, sulfinpirazona, quinolonas, tacrolimús, zidovudina. EmbarazoFlurbiprofeno, otros preparados para la garganta La inhibición de la síntesis de las prostaglandinas afecta de forma adversa al embarazo y al desarrollo embriofetal. Existen datos de estudios epidemiológicos que sugieren un aumento de riesgo de aborto y de malformación cardíaca y gastrosquisis tras la toma de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas al principio del embarazo. El riesgo absoluto de malformación cardiovascular aumentó de menos del 1% hasta el 1,5% aproximadamente. Parece que el riesgo aumenta en función de la dosis y la duración del tratamiento. La administración de inhibidores de la síntesis de prostaglandinas en animales ha producido como resultado un aumento de pérdida de fetos pre- y postimplantación y de letalidad embriofetal. Además, se ha notificado un aumento de incidencias de diferentes malformaciones, incluyendo cardiovasculares, en animales a los que se suministró un inhibidor de la síntesis de prostaglandina durante el período organogénico. Durante el primer y segundo trimestres del embarazo debe evitarse la administración de flurbiprofeno, a no ser que sea estrictamente necesario. Si se administra flurbiprofeno a una mujer que planea concebir, o durante el primer y segundo trimestre de embarazo, deberá administrarse la dosis menor que sea eficaz durante el menor tiempo posible. Durante el tercer trimestre del embarazo, todos los inhibidores de la síntesis de prostaglandinas pueden exponer al feto a: toxicidad cardiopulmonar (con cierre prematuro del conducto arterioso e hipertensión pulmonar), disfunción renal, que puede progresar a fallo renal con oligohidramnios. Además, pueden exponer a la madre y al neonato, al final del embarazo, a: posible prolongación del tiempo de hemorragia, un efecto antiagregante que puede producirse incluso a dosis muy bajas, inhibición de contracciones uterinas, que daría lugar a un retraso o prolongación del parto. Por lo tanto, el flurbiprofeno está contraindicado durante el tercer trimestre del embarazo. LactanciaFlurbiprofeno, otros preparados para la garganta En estudios limitados, el flurbiprofeno aparece en leche materna en concentraciones muy bajas y es muy poco probable que afecte al lactante de forma adversa. De todos modos, debido a los efectos adversos que los AINE pueden causar en el lactante, no está recomendado en mujeres en periodo de lactancia. Reacciones adversasFlurbiprofeno, otros preparados para la garganta Mareo, cefalea, parestesia; irritación de garganta; diarrea, ulceración de la boca, náuseas, dolor bucal, parestesia oral, dolor orofaríngeo, molestias en la boca (sensación de calor o quemazón u hormigueo en la boca). © Vidal Vademecum Fuente: El contenido de esta monografía de principio activo según la clasificación ATC, ha sido redactado teniendo en cuenta la información clínica de todos los medicamentos autorizados y comercializados en España clasificados en dicho código ATC. Para conocer con detalle la información autorizada por la AEMPS para cada medicamento, deberá consultar la correspondiente Ficha Técnica autorizada por la AEMPS. Monografías Principio Activo: 18/11/2015 Ver listado de abreviaturas ¿Te imaginas poder solucionar el dolor de garganta rápidamente y sin complicaciones? Graneodin F es una opción confiable que ha demostrado ser efectiva. Este artículo tiene como objetivo proporcionarte información detallada y útil sobre Graneodin F, resolviendo todas tus dudas en torno a este medicamento y su uso en farmacia. ¿Qué es Graneodin F? Graneodin F es un medicamento ampliamente utilizado para aliviar el dolor de garganta. Contiene ingredientes activos que ayudan a reducir la inflamación y proporcionar un alivio rápido y efectivo. Es comúnmente recomendado por médicos y farmacéuticos por su eficacia comprobada. ¿Para qué se Utiliza Graneodin F? Graneodin F se utiliza principalmente para aliviar el dolor de garganta asociado con: Amigdalitis Faringitis Infecciones bucales menores Además, también puede ser útil para aliviar molestias relacionadas con la voz, especialmente en personas que usan mucho la voz como cantantes o maestros. Principales Beneficios de Graneodin F Al optar por Graneodin F, obtienes varios beneficios que lo han convertido en un producto de confianza en muchas farmacias: Alivio rápido: Gracias a sus componentes activos, proporciona un alivio casi inmediato del dolor de garganta. Fácil de usar: Su formato facilita la administración y asegura que cualquier persona pueda utilizarlo sin problemas. Eficacia comprobada: Está respaldado por numerosos estudios y recomendaciones médicas. ¿Quiénes pueden Utilizar Graneodin F? Graneodin F es adecuado para adultos y niños bajo la supervisión de un médico o farmacéutico. Es importante consultar a un profesional de la salud para asegurarse de que este medicamento es el más adecuado para tus síntomas específicos. Consideraciones Importantes Al igual que con cualquier medicamento, es crucial seguir las instrucciones de uso y tener en cuenta cualquier posible contraindicación. Si tienes alguna condición médica preexistente o estás tomando otros medicamentos, consulta con tu médico antes de usar Graneodin F. - Graneodin F es una opción confiable y efectiva para aliviar el dolor de garganta rápidamente. Su eficacia y facilidad de uso lo convierten en una opción preferida tanto por usuarios como por profesionales de la salud. Recuerda, siempre es importante consultar a un profesional antes de empezar a usar cualquier medicamento. ``` *Consulta a tu médico. Graneodín F es un medicamento de venta libre que se utiliza para aliviar el dolor e inflamación de garganta de leve a moderado. Su fórmula contiene flurbiprofeno, un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que actúa bloqueando la producción de prostaglandinas, sustancias que provocan dolor e inflamación. Alivio rápido del dolor de garganta: Graneodín F actúa en pocos minutos para aliviar el dolor de garganta, lo que te permite sentirte mejor rápidamente. Reduce la inflamación: El flurbiprofeno reduce la inflamación de la garganta, lo que facilita tragar y reduce la sensación de irritación. Efecto prolongado: Graneodín F proporciona un alivio del dolor de garganta hasta por 4 horas. Fácil de usar: Las pastillas de Graneodín F son de fácil administración y se disuelven rápidamente en la boca. Sin azúcar: Graneodín F no contiene azúcar, lo que lo hace ideal para personas con diabetes o que controlan su consumo de azúcar. Pisalak: Qué es y para qué sirve Graneodín F está indicado para adultos y niños mayores de 12 años que sufren de dolor e inflamación de garganta de leve a moderado, causados por: Resfriados Gripe Faringitis Laringitis Amigdalitis Irritación de garganta por polvo, humo o sequedad Adultos y niños mayores de 12 años: Disolver una pastilla lentamente en la boca cada 4 a 6 horas. No tomar más de 4 pastillas al día. Niños de 2 a 12 años: No se recomienda su uso en niños menores de 12 años sin consultar a un médico. Graneodín F no está indicado para personas que: Sean alérgicas al flurbiprofeno o a otros AINEs. Tengan úlcera gástrica o duodenal activa. Sufran de enfermedades renales o hepáticas graves. Tengan antecedentes de asma o broncoespasmo. Estén embarazadas o en período de lactancia. En general, Graneodín F es bien tolerado. Los efectos secundarios más comunes son: Molestias gastrointestinales leves, como náuseas, vómitos o diarrea. Reacciones alérgicas cutáneas, como erupciones o picazón. Dolor de cabeza. Si experimenta algún efecto secundario grave, suspenda su uso y consulte a un médico. No, Graneodín F no es un antibiótico. Es un antiinflamatorio no esteroideo (AINE) que actúa bloqueando la producción de prostaglandinas, sustancias que provocan dolor e inflamación. No, Graneodín F no está recomendado para mujeres embarazadas o en período de lactancia. Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento. No, Graneodín F no está recomendado para personas con úlcera gástrica o duodenal activa. Consulte a su médico antes de tomar cualquier medicamento. No se recomienda tomar Graneodín F durante más de 7 días consecutivos sin consultar a un médico. Alfa Abuzz: Qué es y para qué sirve Graneodín F se puede comprar en farmacias sin receta médica. Recuerda: Este artículo tiene fines informativos y no pretende ser un consejo médico. Consulte con su médico antes de usar cualquier medicamento. Beba muchos líquidos: La hidratación ayuda a mantener la garganta húmeda y reduce la irritación. Haga gárgaras con agua salada: Mezcle media cucharadita de sal en un vaso de agua tibia y haga gárgaras varias veces al día. Use un humidificador: El aire húmedo puede ayudar a aliviar la sequedad y la irritación de la garganta. Soy sociólogo y redactor que investiga de diversidad de temas. He creado sitios como amecap.com.mx sobre sueldos profesionales o Difiere sobre las diferencias entre el mundo. ¿Por qué Graneodín® B ayuda a aliviar el dolor de garganta?Graneodín® B pertenece al grupo de medicamentos para el dolor de garganta denominados anestésicos de acción local.Graneodín® B con Benzocaína son pastillas para el dolor de garganta que alivian el dolor y el malestar que acompañan a los procesos irritativos leves de la garganta. ¿Por qué Graneodín® F ayuda a aliviar la inflamación de garganta?Graneodín® F contiene flurbiprofeno. El flurbiprofeno pertenece a un grupo de medicamentos para el dolor de garganta denominados antiinflamatorios no esteroideos (AINES). Este grupo de medicamentos actúa modificando la respuesta del cuerpo ante el dolor, la inflamación y la fiebre.Graneodín® F se utiliza como auxiliar para aliviar los síntomas del dolor de garganta tales como la irritación, el dolor y la inflamación. ¿Son las pastillas Graneodín® B/Graneodín® F aptos para diabéticos/celiacos?Graneodín® B pastillas para chupar sabor Frambuesa, Miel Limón y Menta Eucalipto, así como Graneodín® F pastillas para la garganta sabor naranja no contienen azúcar, ni sacarosa. Además, estos tratamientos para el dolor de garganta tampoco contienen gluten ni derivados del trigo.Graneodín® F pastillas Miel Limón contiene azúcar.De todas formas, debe tener especial cuidado si padece dichas enfermedades y consultar a su médico, quien evaluará su situación clínica en concreto. Dada la amplia gama de pastillas Graneodín® B/Graneodín F, ¿qué puedes tomar para el dolor de garganta con irritación? El malestar de garganta varia desde la irritación hasta el dolor e inflamación de garganta. Para cada síntoma de dolor de garganta tenemos una pastilla para chupar adecuada. Consulta nuestra gama de productos para más información o para saber qué se puede tomar para el dolor de garganta. ¿Pueden los niños tomar Graneodín® B/Graneodín® F?Graneodín® B con Benzocaína pastillas está indicado como medicamento para el dolor de garganta en niños a partir de 6 años. Graneodín® F con Flurbiprofeno pastillas está indicado en adultos y niños mayores de 12 años. ¿Cuál es la dosis y modo de empleo de Graneodín B/ Graneodín® F?Disolver una pastilla para el dolor de garganta de Graneodín® B en la boca cada 2 horas y hasta un máximo de 8 pastillas al día. No exceder la dosis recomendada.Si después de 3 días de tratamiento para el dolor de garganta hay persistencia o empeoramiento de los síntomas, suspender el tratamiento y consultar a su médico.Dosis y modo de empleo de Graneodín® F: Disolver una pastilla lentamente en la boca cada 4 a 6 horas, según se requiera. Máximo 5 pastillas